

PRZYGOTOWANIE DO ENDOSKOPII KAPSUŁKOWEJ

Endoskopia kapsułkowa jest jedynym badaniem, które pozwala na obejrzenie śluzówkę jelita cienkiego „od wewnątrz”. Jest to badanie szczególnie przydatne w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna, krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmian chorobowych, które mogą być zlokalizowane w jelicie cienkim (m.in. nowotworowych).

Jak przygotować się do endoskopii kapsułkowej?

Pacjent nie powinien jeść przez 24 godziny przed ustaloną datą i godziną badania. W tym okresie może jednak pić dowolną ilość klarownych, niegazowanych płynów. Picie płynów należy przerwać na 4 godziny przed ustaloną godziną badania.

Jeśli pacjent cierpi na zaparcia, lub wypróżnia się nieregularnie lub rzadziej niż codziennie, prosimy dzień przed badaniem rano przyjąć lek przeczyszczający - 2 torebki preparatu Fortrans rozpuszczone w 2 litrach wody.

Przebieg badania

Przed rozpoczęciem badania założony zostanie na pasku rekorder, który będzie zbierał sygnały z kamery mieszczącej w kapsułce i zapisywał w postaci filmu. Po założeniu rekordera, pacjent połyka kapsułkę, która ma wielkość dużej tabletki i popija wodą. Kapsułka jest całkowicie szczelna i jednorazowa. Przemieszcza się ona przez przełyk, żołądek i jelito cienkie wysyłając do rekordera obraz wnętrza tych narządów.

Po 3 godzinach od połknięcia kapsułki pacjent może rozpocząć picie płynów, a po kolejnych 2 godzinach zjeść niewielki posiłek.

Po 8 godzinach od rozpoczęcia badania prosimy o ponowną wizytę w naszej klinice. Zdejmujemy wtedy rekorder z zapisem filmowym.

Kapsułka zostaje zwykle wydalona podczas wypróżnienia w następnych dniach.

Wynik badania będzie dostępny po kilku dniach - lekarz oceniający musi obejrzeć 8 godzinny film zapisany w rekorderze.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań związanych z przygotowaniem do badania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 71 707 21 11 (Centrum Medyczne Melita Medical).